


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 2, No 2 (1951)



back matter

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17455](https://doi.org/10.12681/jhvms.17455)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1951). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 2(2), 89–96. <https://doi.org/10.12681/jhvms.17455>

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Κατ' ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. E. S. Tierkel τῆς ὑπηρεσίας τῆς Δημοσίας ὑγείας τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν, ἐπειδὴ ἡ λύσσα δεικνύει τάσεις ἐπικινδύνου ἐξαπλώσεως, ἡ ὑπηρεσία Δημ. ὑγείας συνέστησεν εἰδικὴν Ἐπιτροπὴν καταπολεμήσεως αὐτῆς ἐξαρτωμένην ἐκ τοῦ Κτηνιατρικοῦ Ὑμῆματος τῆς ὡς ἄνω ὑπηρεσίας μὲ σκοπὸν τὸν συντονισμόν καθ' ἅλασαν τὴν Ἐπικράτειαν τῶν μέτρων καταστολῆς τῆς νόσου ταύτης.

Ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ κάτωθι προβλήματα.

1) Τὴν Ἐργαστηριακὴν διάγνωσιν. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀνεύρεσις τῶν Σωματίων τοῦ Negri δὲν εἶναι πάντοτε σταθερὰ (10 - 12 % ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα) προτείνεται ὁ ἐνοφθαλμισμὸς λευκῶν μυῶν διὰ νευρικῆς οὐσίας ἐκ λυσοσπόντων ζώων. Ἡ μέθοδος αὕτη θεωρεῖται ἀσφαλὴς καὶ ἡ διάγνωσις τίθεται, εἴτε ἐκ τῶν κλινικῶν συμπτωμάτων ἐπὶ τῶν ἐνοφθαλμισθέντων πειραματοζώων, εἴτε ἐκ τῆς ἀνευρέσεως τῶν Σωματίων Negri εἰς τὴν ἐγκεφαλικὴν οὐσίαν αὐτῶν.

2) Μελέτη τῶν διαφόρων προφυλακτικῶν ἐμβολίων τῶν χρησιμοποιουμένων δι' ἐμβολιασμόν τῶν κυνῶν καὶ ἰδίως τοῦ ἐπ' ἐσχάτων τεθέντος ἐν χρήσει Vaccin Avianisé (ζῶν ἰὸς στέλεχος Flury καλλιεργούμενος εἰς γόνιμα ὡά).

3) Συντονισμὸς λήψεως γενικῶν μέτρων καταστολῆς τῆς νόσου, ἥτοι περισυλλογὴ τῶν ἀδεσπότην κυνῶν, ἐξόντωσις τῶν ἀγρίων ζώων, ἀπομόνωσις τῶν λοιμοσπόντων, ἐφαρμογὴ τῶν προληπτικῶν ἐμβολιασμῶν κλπ.

4) Κατάρτισις στατιστικῶν καὶ διοργανώσις εἰδικῶν συνεδρίων καὶ

5) Διαφώτισις τοῦ κοινοῦ ὅπως ἐνστερνισθῇ τὰς ὑποδείξεις τῶν ἀρμοδίων καὶ ἐπικουρήσῃ διὰ τὴν ἐπιτυχῆ καταπολέμησιν τῆς ἐπικινδύνου ταύτης μάστιγος.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11 ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1951

Ἡ Διεύθυνσις τοῦ Δ.Γ.Ε. ἔλαβε τὰς κάτωθι πληροφορίας, τὰς ὁποίας σπεύδει νὰ ἀνακινώσῃ.

1) Τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας τῆς Κολομβίας γνωρίζει (τηλ/μα 30-1-51) ὅτι διεπιστώθη ἡ ὑπαρξις ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ἀνατολικῶν πεδιάδων. Κατὰ τὸ Ἰνστιτούτον τοῦ Pirbricht (Μεγάλῃς Βρετανίας) ἡ ἐπιζωοτία ὀφείλεται εἰς ἰὸν τύπου O.

2) Κατ' ἀνακοίνωσιν, μὲ ἡμερομηνίαν 25-1-51, τοῦ Δρ. Φ. Παπαχριστο-

φίλου Διευθυντοῦ τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Ὑπουργείου Γεωργίας εἰς Ἀθήνας, ὑφίσταται ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν Ἑλλάδι κυρίως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ἀθηνῶν Ἐπιζωοτία ἀφθώδους πυρετοῦ λίαν σοβαρά, προκαλοῦσα βαρεῖας ἀπωλείας (θνησιμότης μέχρι 20 % εἰς ὄρισμένους σταύλους).

Τὸ αἷτιον εἶναι ἰὸς τύπου C, κατὰ διαπίστωσιν τοῦ Ζωοπροφυλακτικοῦ Σταθμοῦ Ρώμης καὶ τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀφθώδους πυρετοῦ τῆς Λυῶνος. Δὲν ἀποκλείεται καὶ ἄλλοι τύποι ἰοῦ νὰ ὑφίστανται καὶ ἰδίως ὁ τύπος A. Ἐλήφθησαν προφυλακτικὰ μέτρα καὶ ἰδίως ἐνοχρόσθη ἐμβολιασμὸς διὰ τριδυνάμου ἐμβολίου O + A + C (ὁ τελευταῖος τύπος ἀπεμονώθη τελευταίως ἐκ παθολογικῶν ὑλικῶν προερχομένων ἐξ Ἑλλάδος).

3) Κατὰ τελευταίαν ἀνακοίνωσιν τοῦ Δρ. Guyaux Κτηνιάτρου Συμβούλου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἀποικιῶν τοῦ Βελγίου ἐσημειώθησαν τὸν Σ/βριον τοῦ 1950.

α) Λύσσα εἰς κύνας 9 κρούσματα εἰς Ἐπαρχίαν Leopoldville

» » βοοειδῆ 1 » » » Elisabethville

127 ἐμβολιασμοὶ διενεργήθησαν διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἐξάπλωσις.

β) 2 ἐστία πανώλους ὀρνίθων εἰς Leopoldville καὶ εἰς Elisabethville, 5442 ἐμβολιασμοὶ διενεργήθησαν διὰ τὸν ἐντοπισμὸν τῶν ἐστιῶν.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου

C. RAMON

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951

Ἡ Διεύθυνσις τοῦ Δ. Γ. Ε. ἔλαβε τὰς ἀκολουθούσας πληροφορίας καὶ σπεύδει νὰ τὰς ἀνακοινώσῃ :

1. Κατὰ τηλεγράφημα ἐκ Tel Aviv (Ἰσραήλ) ὑπὸ ἡμερομηνίαν 6ης Φεβρουαρίου, διεπιστώθη ἀφθώδης πυρετὸς ἐπὶ 127 βοοειδῶν εἰσαχθέντων ἐκ Τουρκίας καὶ τεθέντων ἐν ἀπομονώσει ἐπὶ ἓνα μῆνα εἰς Βυρητόν. Ἡ διαμετακόμισις ἐσταμάτησε, τὰ ζῶα ἀπομονώθέντα εἰς Χάϊφαν ἐσφάγησαν τὴν ἡμέραν τῆς ἀφίξεώς των (Dr Freund Διευθυντῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἰσραήλ).

2. Δι' ἀεροπορικῆς ἐπιστολῆς ἐκ Pretoria Νοτίου Ἀφρικῆς ὑπὸ ἡμερομηνίαν 31 Ἰανουαρίου ἀνακοινοῦται ὅτι διεπιστώθη ἐστία ἀφθώδους πυρετοῦ τὴν 19-1-51 εἰς τὰ βοοειδῆ τῆς συνοριακῆς ζώνης τοῦ Park National Kruger. Ἡ νόσος εἶχεν ἐμφανισθῆ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον τὸ 1944-45. Ἐκτοτε ἡ Νοτιοαφρικανικὴ Ἐνωσις ἐθεωρεῖτο ἀπηλλαγμένη τῆς νόσου. Ὅλα τὰ μέτρα ἐλήφθησαν διὰ τὴν περιστολὴν καὶ κατάπνυξιν τῆς ἐστίας (Dr Diesel Διευθυντῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Νοτιοαφρικανικῆς Ἐνώσεως Pretoria).

3. Ἀγγέλλεται ὁ θάνατος ἐνὸς Εὐρωπαίου τοῦ Leopoldville, δηχθέντος ὑπὸ λυσσῶντος κύνος.

4. Ἐσημειώθη ἡ παρουσία τοῦ Schistosoma bovis εἰς τὰ βοοειδῆ τῆς Κεντρῶας Ἀφρικῆς,

5. Τὸ Δελτίον ὑπ' ἀριθ. 553 τῆς 5 Φεβρουαρίου δημοσιευόμενον ὑπὸ τῆς Ἀργεντινῆς Πρεσβείας εἰς Παρισίους γνωρίζει, ὅτι ὅλοι οἱ κύνες τῆς πόλεως τοῦ Buenos Aires θὰ ἐμβολιασθοῦν ἐναντίον τῆς λύσσης.

6. Ἐγνώσθη ραδιοφωνικῶς ὅτι ἐσημειώθη ἀναζωπύρωσις τῆς ψευδοπανώλους τῶν ὀρνίθων (Newcastle Disease) εἰς Ἀγγλίαν.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου
G. RAMON

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 13 ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951

Ἡ Διεύθυνσις τοῦ Διεθνoῦς Γραφείου ἐπιζωοτιῶν ἀνακοινοῖ τὰς κάτωθι πληροφορίες.

1. Ὁ Καθηγητὴς Fluckiger Διευθυντὴς τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Οἰκονομίας Ἑλβετίας ἀνακοινοῖ ὅτι:

Τὴν 9ην Ἰανουαρίου 1951 διεπιστώθη μία πρώτη ἐστία ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς τὸ Καντόνιον τῆς Schaffhoyse, ἡ ὁποία πιθανῶς προῆλθεν ἐκ γεωμῆλων προοριζομένων διὰ σποράν, μεμολυσμένων δι' ἰοῦ τοῦ ἀφθώδους καὶ εἰσαχθέντων ἐξ Ὀλλανδίας. Ἡ ἐστία ταχύτατα ἐνετοπίσθη καὶ ἀπεσβέσθη διὰ τῶν συνήθων μέσων.

Τὴν 24ην Ἰανουαρίου ἐνεφανίσθη νέα ἐστία ἀφθώδους εἰς τὸ Καντόνιον τῆς Thurgovie. Ἡ ἐστία αὕτη φαίνεται ὅτι ἐδημιουργήθη διὰ τῆς εἰσαγωγῆς γεωμῆλων προερχομένων ἐκ τῆς περιοχῆς τῆς Lille (Βόρειος Γαλλία). Ἡ ἐστία ἐξηκλώθη ταχύτατα καὶ τὴν 15ην Φεβρουαρίου 33 σταῦλοι ἐφέροντο μεμολυσμένοι.

Ἐξ ἄλλου ὁ ἀφθώδης ἐνεφανίσθη εἰς τὸ Καντόνιον τοῦ Saint (2 σταῦλοι) καὶ εἰς τὸ Καντόνιον τῆς Zurich (2 σταῦλοι).

Ὁ ἐν λόγῳ ἰὸς εἶναι λίαν λοιμογόνος.

Ἄμα τῇ ἐμφανίσει τῆς νόσου ἐλήφθησαν μετ' αὐστηρότητος καὶ ἄνευ χρονοτριβῆς ἅπαντα τὰ μέτρα καταπολεμησέως.

α) Ἄμεσος θανάτωσις τῶν ζῶων τῶν μεμολυσμένων σταύλων.

β) Προληπτικὸς ἐμβολιασμὸς ὄλων τῶν βοοειδῶν τῶν περιχώρων. Ἀπὸ τῆς 9ης Ἰανουαρίου καὶ μέχρι σήμερον ἐνεβολιάσθησαν 100.000 βοοειδῆ χωρὶς νὰ σημειωθῇ οὐδεμία διάσπασις τῆς ἀνοσίας

γ) Ἄμεσος ἀπαγόρευσις μετακινήσεως βοοειδῶν, ἀγορῶν, δημοσίων συγκεντρώσεων κλπ.

δ) Ἀπολύμανσις τῶν μεμολυσμένων σταύλων καὶ προληπτικὴ ἀπολύμανσις ὄλων τῶν ὑποκειμένων εἰς τὴν μόλυνσιν τοιούτων.

Τέλος, ἐπειδὴ ἐσημειώθησαν πολλὰ κρούσματα ἀφθώδους εἰς Γαλλίαν πλησίον τῶν Γαλλοελβετικῶν συνόρων, αἱ ἐμπορικαὶ συναλλαγαὶ κατὰ μῆκος τῶν συνόρων τούτων ἀπηγορεύθησαν.

2. Εἰς τὸ Ὑγειονομικὸν δελτίον τῆς Δανίας ἀνεκοινώθη ἐκ μέρους τοῦ Dr Gerhard Petersen Διευθυντοῦ τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας ὅτι ὑπῆρχον τὴν 6ην Φεβρουαρίου ἐν Δανίᾳ 5 ἐστία ἀφθώδους καὶ τὴν 13ην Φεβρουαρίου 3 ἐστία.

3. Δεδομένης, ἀφ' ἐνὸς τῆς ἀναζωπυρώσεως τοῦ ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς πλείστας χώρας, Βέλγιον, Δανίαν, Γαλλίαν Ἑλλάδα, Ὀλλανδίαν, Ἑλβετίαν, Κολομβίαν, Μεξικόν, Βενεζουέλαν κλπ., ἀφ' ἑτέρου τῆς μεγάλης νοσηρότητος καὶ μεταδοτικότητος τοῦ ἀπομονωθέντος ἐν Ἑλβετία ἰοῦ, τὸ Γραφεῖον συνιστᾷ πανταχοῦ τὴν μεγαλυτέραν ἐπαγρύπνησιν. Παρακαλεῖ δὲ ὅπως ἐνημερωθῆ τὸ ταχύτερον μὲ τὸ νέον αὐτὸ ἐπιζωοτικὸν κύμα ἀφθώδους πυρετοῦ, ἵνα δυνηθῆ νὰ διαβιβάσῃ τὸ ταχύτερον τὰς ληφθησομένας πληροφορίας.

Ἐπὶ πλέον τὸ Γραφεῖον ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν τῶν προσβεβλημένων ὑπὸ τοῦ ἀφθώδους (ἢ ἄλλης νόσου) Χωρῶν διὰ νὰ χορηγήσῃ ἀπὸ πληροφορίαν καὶ συμβουλὴν διὰ τὰ ληφθησόμενα μέτρα καὶ ἐν ἀνάγκῃ ν' ἀποστείλῃ ἐπιτοπίως ἕναν ἢ περισσοτέρους ἐμπειρογνώμονας.

4. Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἀποικιῶν τοῦ Βελγίου ἀνακοινούται ὅτι διὰ νὰ περιορισθῆ ἡ ἐπέκτασις τῆς λύσεως εἰς Βελγικὸ Κογκό, ἀπαγορεύεται ἀπὸ 14-2-51 ἡ εἰσαγωγή, ἐξαγωγή καὶ διαμετακόμισις τῶν κυνοειδῶν καὶ αἰλουροειδῶν κατοικιδίων καὶ ἀγρίων.

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου

G. Ramon

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 14 ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1951

Ἡ διεύθυνσις τοῦ Δ.Γ.Ε. ἀνακοινεῖ τὰς κάτωθι πληροφορίας :

1) Ἡ Διεύθυνσις τῆς Κτηνιατρικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος (Κύριος Φ. Παπαχριστοφίλου ὑπὸ ἡμερομηνίαν 21 Φεβρουαρίου

Ὁ Ἀφθώδους πυρετός ἐσημειώθη εἰς ἕν φορτίον 310 βοοειδῶν προερχομένων ἐκ Συρίας καὶ Λιβάνου. Διετάχθη ἡ ἀμειωμένη σφαγὴ τῶν ζώων τούτων δι' ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ἀπὸ 29 Ἰανουαρίου 1951 καὶ ἀπηγορεύθη πᾶσα εἰσαγωγή σφαγίων ἐκ τῶν ὡς ἄνω χωρῶν.

2) Ἡ Γενικὴ Διοίκησις τῆς **Μοζαμβίκης** (τηλεγράφημα 28ης Φεβρουαρίου).

Ἄφθώδης πυρετός ἐσημειώθη ἐπ' ἐσχάτων ἐπὶ 53 βοοειδῶν τῆς περιφερείας Noamba ὑπὸ ἐλαφρὰν μορφὴν.

3) Εἰς Μαδαγασκάρην ἐπιπολάζει ἤδη ἡ ἐπιζωοτία Μολυσματικὴ παραπληγία τῶν χοίρων (Νόσος τοῦ Teschen) ἰδίως εἰς τὴν περιφέρειαν τῆς Tananarive (Ἐπιζωοτικὸν Δελτίον Μαδαγασκάρης τῆς 19)2)51).

4) Πληροφορίαι ἐπὶ τῆς σημειωθείσης ἐν Μεγ. Βρετανία ἐπιζωοτίας πανώλους τῶν ὀρνίθων (συμφώνως πρὸς δημοσίευσιν τοῦ Veterinary Record τῆς 3)2)51).

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Γεωργίας προέβη εἰς σχετικὰς ἀνακοινώσεις εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Κοινοτήτων, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου ἐσημειώθησαν 260 ἐστίαί τῆς νόσου. Ἐλήφθησαν ὅλα τὰ μέτρα πρὸς περιστολὴν, συνιστάμενα εἰς τὴν θανάτωσιν τῶν ἀσθενῶν καὶ λοιμυπότων, ἀπομόνωσιν τῶν ὑπόπτων ἐστιῶν, ἀπολυμάνσεις, πρακτικὰς συμβουλὰς διὰ τὴν ἔγκαιρον διάγνωσιν τῆς νόσου ὑπὸ τῶν κτηνοτρόφων, ἀπαγόρευσιν εἰσαγωγῶν ζώντων καὶ σφαγέντων πουλερικῶν ἐκ χωρῶν προσβεβλημένων ἐκ τῆς νόσου ταύτης. Ἀπεφασίσθη νὰ ἀκολουθηθῇ τὸ σύστημα τῆς θανατώσεως πρὸς κατάπνιξιν τῶν ἐστιῶν καὶ ἐὰν τοῦτο δὲν ἦθελε κριθεῖ λυσιτελές, τότε θὰ ἀντιμετωπισθῇ, ἡ ἐφαρμογὴ ἄλλων μέτρων, καίτοι κρίνεται ὅτι πᾶσα ἄλλη γνωστὴ μέθοδος προφυλάξεως δίδει ἀποτελέσματα ὀλιγώτερον ἀποτελεσματικά.

Ὁ Διευθυντὴς

C. RAMON

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 15 ΤΗΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1951.

Ἡ Δις τοῦ Διεθνoῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν ἀνακοινοῖ τὰς κάτωθι πληροφορίας.

1) Κατὰ τὸν Καθηγητὴν Fluckiger Διευτὴν τῆς Κτηνιατρικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Οἰκονομίας τῆς Ἑλβετίας, ἡ σημειωθείσα ἐπιζωοτία ἀφθώδους πυρετοῦ ἐν Ἑλβετία, καὶ ἡ ὁποία εἶχε ἀνακοινωθεῖ εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 13 19)2)51 ἐγκύκλιον, δύναται νὰ θεωρηθῇ κατασταλεῖσα, χάρις εἰς τὰ ριζικὰ μέτρα τὰ ὁποία ἐλήφθησαν καὶ ἰδίως εἰς τὴν θανάτωσιν καὶ τὸν ἐμβολιασμόν. Μόνον μία ἐστία ὑφίσταται σήμερον, ἡ ὁποία τείνει νὰ ἀποσβεσθῇ.

2) Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν Ὑγειονομικῶν Δελτίων τῆς Δυτικῆς Γερμανίας.

Ἐνῶ τὴν 1ην Σ)βρίου 1950 ὑπῆρχε εἰς τὴν Δυτ. Γερμανίαν μία μόνον ἐστία ἀφθώδους, τὴν 15ην Φ)βρίου ἐσημειοῦντο 620 ἔτεροι εἰς 231 Κοινότητες.

3) Κατὰ τὰς τελευταίας πληροφορίες ἐκ Μαδαγασκάρης, ἡ ἐπιζωοτία ἐπὶ χοίρων τῆς περιοχῆς τῆς Tananariva ἐταυτοποιήθη ὡς νόσος τοῦ Tesehen.

4) Κατ' ἐκθεσιν διαβιβασθεῖσαν παρὰ τοῦ Sir Dallingy Δ)ντοῦ τῆς Κτηνιατρικῆς Ἑπιζωοτίας τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἡ ἐπιζωοτία τῆς ψευδοπανώλους ἥτις ἐνέσκηψεν εἰς τὴν χώραν ταύτην εὐρίσκεται ἐν ὑφέσει, καὶ δὲν παρουσιάζεται πλέον εἰμὴ ὡς ἐλαφρὰ νόσησις. Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον ἐξεδηλώθησαν τὰ ἐλάχισται νέαι ἐστία, χωρὶς ἑξαπλώσεως.

Τὴν 1ην Μαρτίου 1951 δὲν ὑπῆρχον πλέον παρὰ 8 ἐστία εἰς Ἄγγλιαν καὶ 2 εἰς Σκωτίαν.

Ὁ Δ)ντὴς τοῦ Γραφείου

C. RAMON

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Ἀπολύσεις ἐφέδρων κτηνιάτρων

Διὰ Β. Δ. ἀπελύθησαν ἐκ τῶν τάξεων τοῦ Στρατοῦ οἱ κάτωθι ἐφεδροὶ κτηνιατρικοὶ ἀξιωματικοί:

Ἑποκτηνίατρος Θεωμᾶς Μαργαρίτης, καὶ οἱ ἀνθυποκτηνίατροι, Δημόλικας Βασίλειος, Σακελαρίδης Θεόδωρος, Σπυριδάκης Σπυρίδων, Φουράκης Παῦλος, Σωτηρόπουλος Κων)τίνος τοῦ Σ., Ζαρκοδημος Γρηγόριος καὶ Τριαντόπουλος Ἐλευθέριος.

Προαγωγὰὶ Πολ. Κτηνιάτρων

Διὰ Β.Δ. προήχθησαν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Τμηματάρχου Α'. οἱ Τμηματάρχαι Β'. κ.κ. Δοντᾶς Κωνσταντῖνος καὶ Καρδάσης Ἰωάννης.

Μεταβολαὶ καὶ κινήσεις Πολ. Κτηνιάτρων

Ἀπεσπᾶσθη ἐπὶ ἐξάμηνον ὁ κ. Σπαῆς Ἀλέξανδρος εἰσηγητῆς, παρὰ τῷ Κτηνιατρικῷ Μικροβιολογικῷ Ἰνστιτούτῳ Ἑπιζωοτιολογικοῦ Γραφείου Γεωργίας.

Ἀνεχώρησεν ἐπὶ εἰδικῇ ἀποστολῇ εἰς Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Ὀλλανδίαν ὁ μικροβιολόγος κ. Τζωρτζιάκης Νικόλαος πρὸς μελέτην διὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἴδρυσιν Ἀντιαρθρώδους Ἰνστιτούτου.

Ἐπέστρεφεν ἐκ τῆς ἀνά τὴν Περσῶν Ἀνατολὴν περιουσίας του διὰ τὴν προμήθειαν ζώων ὁ Νομοκτηνίατρος κ. Ξηρουχάκης Ἐμμανουήλ.

Κρεοσκοπικαὶ πληροφορίες

Ἐπὶ τῆς Κρεοσκοπικῆς Ἑπιζωοτίας κατεσχέθησαν καὶ κατεστράφησαν ἀκέραια 4 βοοειδῆ καὶ 474 προβατοειδῆ διὰ σηψαιμίας καὶ 4 χοῖροι διὰ τριχινιάσιν. Ἐπίσης σπλάγχνα βοειδῶν 481 διὰ φυματίαν, 2603 διὰ ἐχينوκοκκίαν, 1078 διὰ διστομίαν, καὶ 210 δι' ἄλλας αἰτίας. Ὡσαύτως 7481 ὄκ. ἰχθύων καὶ 15 ὄκ. τυροῦ.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

M. E. SYNODINOS Contribution à l' etude du dosage de l' adrenaline.
(Συμβολή εις τήν μελέτην τοῦ ποσοτικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς Ἀδρεναλίνης)
R. Foulon, 29 Rue Deparcieux, Paris 14e - 1950.

Μεταξὺ τῶν διαφόρων μεθόδων τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ἀδρεναλίνης ὁ συγγραφεὺς περιγράφει ἐκεῖνας, αἱ ὁποῖαι λόγῳ τῆς εὐαισθησίας τῶν χρησιμοποιουμένων διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς Ἀδρεναλίνης εἰς τὸ αἷμα, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐκθίεται ἰδίαν μέθοδον διὰ τῆς παρα-νιτροανιλίνης, ἣτις εἶναι κατὰ πολὺ ἀπλουστερα τῶν μέχρι σήμερον γνωστών.

Ἡ μέθοδος αὕτη βασίζεται ἐπὶ τῆς κυανῆς χροιάς τὴν ὁποίαν δίδει ἡ Ἀδρεναλίνη παρουσία ὀξύνου διαλύσεως παρα-νιτρονιλίνης, τῇ προσθήκῃ Νιτρῶδους Νατρίου καὶ ἀλκαλοποιήσεως.

Ἡ εὐαισθησία τῆς μεθόδου ἣτις ἐξικνεῖται μέχρι 10 - 7 ἐπιτρέπει τὸν χρωματομετρικὸν προσδιορισμὸν τῆς Ἀδρεναλίνης εἰς πυκνότητα 0,1 - 16 mg. κατὰ κ. ἔ. δύναται δὲ νὰ χρησιμοποιηθῇ εἰς τὸν προσδιορισμὸν τῆς Ἀδρεναλίνης εἰς τὰ ἐπινεφρίδια. Ἡ χρησιμοποίησις εἰς τὸ αἷμα παρουσιάζει εἰσέτι δυσκολίας τινάς, τὰς ὁποίας ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἔρευναί ἐλπίζεται ὅτι θὰ ὑπεργικήσῃ. K.B.T.

ΝΙΚ. ΑΣΠΙΩΤΗ Φυσιολογικὴ Διατροφή τῶν Ζώων. Ἀθήνα 1950.

Τὸ ἐξαιρέτον σύγγραμμα τοῦ συναδέλφου κ. Ν. Ἀσπιώτη ἔρχεται νὰ συμπληρώσῃ ἐν κενὸν ὑφιστάμενον πράγματι εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κτηνιατρικὴν Βιβλιογραφίαν.

Μὲ μεγάλην σαφήνειαν ἀλλὰ καὶ γλαφυρότητα πραγματεύεται θέματα, ἅτινα ἐνέχουσιν μεγίστην σπουδαιότητα τόσον διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνοτροφίας ὅσον καὶ τὴν ὀρθολογικὴν ἐκμετάλλευσιν αὐτῆς. Δὲν εἶναι βεβαίως δυνατόν νὰ δοθῇ εἰς ὀλίγας γραμμάς ἀνάλυσιν ἐνὸς βιβλίου καλύπτοντος 300 σχεδὸν σελίδας, δι' ὃ καὶ ἀρκούμεθα νὰ ἀναφέρωμεν τὸ περιεχόμενον τῶν 14 κεφαλαίων εἰς τὰ ὁποῖα τοῦτο διαιρεῖται:

Βασικαὶ ἀρχαὶ τῆς φυσιολογικῆς διατροφῆς. Ἡ ἐνέργεια. Αἱ πρωτεΐδαι. Αἱ μὴ ἄζωτοῦχοι ὀργανικαὶ θρεπτικαὶ οὐσίαι. Αἱ ἀνόργανοι οὐσίαι (ἄλατα). Αἱ βιταμῖναι. Αἱ ξηραὶ οὐσίαι τοῦ σιτηρεσίου. Τὸ πόσιμον ὕδωρ. Ὁ καθορισμὸς τῶν εὐθηνότερων τροφῶν. Νομειτικοὶ πόροι τοῦ Κράτους. Αἱ θρεπτικαὶ ἀνάγκαι τῶν ζώων τῆς Ἑλλάδος. Διατρέφονται φυσιολογικῶς τὰ ζῶα ἐν Ἑλλάδι; Ἐνδεικνυόμενα μέτρα πρὸς φυσιολογικώτεραν διατροφήν τῶν ζώων μας:

Εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο κεφάλαιον ὁ συγγραφεὺς προτείνει σειρὰν μέτρων, τὰ ὁποῖα ἐφαρμοζόμενα θὰ ἐπιφέρουν πράγματι σημαντικὴν βελτίωσιν εἰς τὴν Ἑθνικὴν μας Κτηνοτροφίαν. K.B.T.

ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Τὰ λάθη εἶνε ἀνθρώπινα καὶ φυσικὸν εἶνε καὶ τὸ Δελτίον τῆς Ἑλλ. Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας—ἔργον ἀνθρώπινον καὶ αὐτό—νὰ μὴ δύναται νὰ τὰ ἀποφεύγῃ. Πάντως παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνώσται τοῦ Δελτίου, εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν ὁποίων περιπίπτουν τυχὸν λάθη, νὰ τὰ καθιστῶσι γνωστὰ εἰς τὴν Σύνταξιν τοῦ Δελτίου ἐγκαιρῶς πρὸς διόρθωσιν των.

Οὕτω οἱ ἀναγνώσται παρακαλοῦνται νὰ διαγράψουν ἐκ τοῦ τελευταίου στίχου τῆς σελίδος 38 τοῦ 1ου τεύχους τοῦ Δελτίου τὰς λέξεις «εἶτε ἐξ ἀντιβιταμινώσεως» αἰτινες (μὴ ὑπάρχουσαι εἰς τὸ δακτυλογραφημένον κείμενον) ἀποτελοῦσι πλεονασμὸν.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Κ. Ταρλατζή και Θ. Χριστοδούλου: Αί μαστίτιδες τῶν ἀγελάδων καὶ ἡ ἀπὸ ἀπόψεως δημοσίας ὑγείας σημασία αὐτῶν	Σελ. 54—61
Ἐμμ. Μαθθαϊάκη (Ἀρχικτηνιάτρου): Κλινικαὶ παρατηρήσεις καὶ αἰτιολογικαὶ ἔρευναι ἐπὶ τῆς μολυσματικῆς παραπληγίας τοῦ ἵππου. (Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)	» 62—71
Κωνστ. Σ. Κίννα: Περὶ τῶν ἐν ταῖς Ἴπποδρομίαις χρησιμοποιουμένων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν (Ντόπιν) ὡς διεγερτικῶν μέσων	» 72—77
Ἀθανασίου Ἐπιτρόπου: Ἡ Κρατικὴ πρόνοια ὑπὲρ τῶν Γεωργοκτηνοτρόφων διὰ τῆς Κτηνιατρικῆς Περιθάλψεως	» 78—83
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ: Ἡ δι' ἀντιβιοτικῶν θεραπευτικὴ ἀγωγή ἐν τῇ Κτηνιατρικῇ	» 83—86
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ	» 86—88:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΖΩΤΙΩΝ	» 89—93
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ	» 94
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ	» 95

TABLE DES MATIÈRES

TRAVAUX ORIGINAUX

E. Tarlatzis et Th. Cristodoulou: Les mammites des vaches et leur importance pour la santé publique	Pag. 54—61
Em. Mathaiakis (Lieut. Colonel Vétérinaire): Observations cliniques et recherches expérimentales sur la paraplegie infectieuse du cheval	» 62—71
C. Kinnas: Des substances pharmaceutiques employées pour le doping des chevaux de Course	» 72—77
A. Epitropou: La prévoyance sociale en faveur des éleveurs	» 78—83
EXTRAIT ET ANALYSES	» 83—88
INFORMATIONS DE L' OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES	» 89—93
NOUVELLES OFFICIELLES	» 94
BIBLIOGRAPHIE	» 95