Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 13, No 1 (1962)

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΚΩΛΗΚΟΣ MESOCESTOIDES LINEATUS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΕΤΡΑΤΗΥΡΙΔΙΟΜ ΒΑΙΛΛΕΤΙ ΕΠΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ

A. Γ. ΒΕΛΤΣΟΣ

doi: [10.12681/jhvms.17887](https://doi.org/10.12681/jhvms.17887)

Copyright © 2018, A. Γ. ΒΕΛΤΣΟΣ

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

ΒΕΛΤΣΟΣ Α. Γ. (1962). ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΚΩΛΗΚΟΣ MESOCESTOIDES LINEATUS ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΕΤΡΑΤΗΥΡΙΔΙΟΜ ΒΑΙΛΛΕΤΙ ΕΠΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 13(1), 277–280. <https://doi.org/10.12681/jhvms.17887>

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΚΩΛΗΚΟΣ *MESOCESTOIDES LINEATUS* ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΗΣ ΑΥΤΟΥ *TETRATHYRIDIMUM BAILLETI* ΕΠΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ

Υ π ο

Α. Γ. ΒΕΛΤΣΟΥ

(Δ/ντοῦ τοῦ 984 Κτηνιατρικοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν)

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1959 καὶ τὸν Μάρτιον τοῦ 1961 ἔσχομεν τὴν εὐκαιρίαν νὰ διαπιστώσωμεν εἰς δύο διαφορετικὰ εἶδη ζώων (τὴν γαλῆν καὶ τὸν κύνα) τὴν προνυμφικὴν μορφήν, ὥς καὶ τὴν ὄριμον τοιαύτην τοῦ κεστώδους σκώληκος : *Mesocestoides lineatus*. Τὸ παράσιτον τοῦτο, τόσον ὑπὸ τὴν προνυμφικὴν μορφήν ὅσον καὶ τὴν ὄριμόν του τοιαύτην, διὰ πρῶτην φορὰν ἀναφέρεται εἰς τὴν χώραν μας. Ἀπὸ παθολογικῆς πλευρᾶς ἡ προνυμφικὴ μορφή ἀποκαλουμένη *Tetrathyridium balleti* προκαλεῖ τὴν τετραθυριδίασιν τοῦ κυνὸς καὶ συχνότερον τῆς γαλῆς, χαρακτηριζομένην ἐκ τῆς παρουσίας τῶν προνυμφικῶν τούτων μορφῶν εἰς τὸ περιτόναιον καὶ σπανιώτερον εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ὑπεζοκῶτος. Ἡ ἐντόπισις εἰς τὸ περιτόναιον προκαλεῖ τὸν παρασιτολογικῆς προελεύσεως ἀσκήτην τῆς γαλῆς ἢ τοῦ κυνός, νόσου δυσχεροῦς διαγνώσεως καὶ ἀνιάτου.

Ὁ ὄριμος σκώληξ ἐντοπίζεται εἰς τὸ ἔντερον τοῦ κυνός ἢ τῆς γαλῆς, προκαλεῖ δὲ ἀπὸ πλευρᾶς παθολογίας τὰς αὐτὰς περίπου συνεπείας ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ ταινίαι.

Παρασιτολογικὰ δεδομένα : Ὁ σκώληξ *M. l.* ἀποτελεῖ εἶδος τῆς οἰκογενείας *Mesocestoididae* τῆς τάξεως *Cyclophyllidea* τῶν κεστωδῶν σκωλήκων.

Κύριον χαρακτηριστικὸν τοῦ σκώληκος : ἡ ἐν τῷ μέσῳ τῆς προγλωττίδος τοποθέτησις τοῦ ἐκφορητικοῦ πόρου. Τὸ μήκος τοῦ ὄριμου σκώληκος κυμαίνεται μεταξὺ 0,3 - 2,5 μέτρα. Ἡ κεφαλὴ ἔχει σχῆμα ροπαλοῦ καὶ φέρει 4 ἀπομυζητικὰς θηλὰς ἀνευ ὀδόντων. Προγλωττίδας σχήματος σπύρου πέπονος μήκους 4 - 5 m.m. καὶ πλάτους 2 - 3 m.m. Ἐντὸς τῶν ὀρίμων προγλωττίδων διακρίνεται καλῶς ὁ ὠσθύλαξ, ἡ μήτρα, ἥτις ἀπολήγει εἰς τὸν ἐκφορητικὸν πόρον, ὡς καὶ οἱ ὄρχεις 54 - 56 τὸν ἀριθμὸν κατὰ δακτύλιον.

Ὡὰ σχήματος ὠσειδοῦς διαστάσεων 40 - 60 × 35 - 43 μ. φέροντα δύο λεπτὰς μεμβράνας.

Ἡ προνυμφικὴ μορφή : *Tetrathyrium balleti* ἔχει σχῆμα μικροῦ σκώληκος λίαν ἐκτατοῦ καὶ συσταλοῦ, μήκους 2 - 3 ἐκ., ἐνίοτε ὅμως εἶναι κατὰ πολὺ μακρύτερος.

Ἡ κεφαλὴ στερεῖται ρύγχους, φέρει δὲ 4 ἀπομυζητικὰς θηλάς. Αἱ γνώσεις ὅσον ἀφορᾷ τὸν βιολογικὸν κύκλον τοῦ παρασίτου εἶναι ἀνεπαρκεῖς. Προνυμφικαὶ μορφαὶ χορηγούμεναι εἰς κύνας καὶ γαλαῖς δίδουν εἰς τὸ ἔντερον τούτων ὥριμον σκώληκα (Neumann).

Ὡὰ ὥριμον σκώληκος ἐν τούτοις χορηγούμενα εἰς τὰ αὐτὰ ζῶα δὲν προκαλοῦν μόλυνσιν. Ὑφίσταται συνεπῶς ἐνδιάμεσός τις ἢ περισσότεροι ξενισταί, οἵτινες παραμένουν ἄγνωστοι.

Ὁ ὥριμος σκώληξ ἐντοπίζεται εἰς τὸ ἔντερον τῆς γαλῆς, τοῦ κυνὸς ὡς καὶ ἐτέρων σαρχοφάγων ζώων. Ἡ προνύμφη ἀνευρίσκεται ἐλευθέρᾳ ἢ ἐγκυστομένη εἰς τὴν περιτοναϊκὴν κοιλότητα, σπανιώτερον δὲ εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ ὑπεξοκῶτος. Ἐνίοτε ἀνευρίσκεται προσκεκολλημένη εἰς τὸ ἥπαρ.

Ἡμέτερα περιστατικά : 1ον) Τὸ πρῶτον περιστατικὸν ἀφορᾷ τὴν προνυμφικὴν μορφήν *Tetrathyridium bailleti* ἀνευρεθεῖσαν τὴν 18 Φεβρουαρίου 1959, ἐπὶ γαλῆς γενεᾶς ἀκαθορίστου, γένους θηλυκοῦ, ἡλικίας περίπου 3 ἐτῶν, ιδιοκτησίας Ἀμερικανοῦ ἱατροῦ G. M. γεννηθείσης καὶ παραμεινάσης καθ' ὅλην τὴν ζωὴν τῆς ἐν Ἑλλάδι. Τὸ ἱστορικὸν ἀναφέρει ὅτι, τὸ πρῶτον 10ήμερον τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου 1958 ἡ γαλῆ παρουσίασεν οἴστρον. Δύο ἑβδομάδας ἀργότερον, ὁ ιδιοκτῆτης παρετήρησεν αὐξήσιν τοῦ ὄγκου τῆς κοιλίας, ἣτις ἀπεδόθη εἰς πιθανὴν κύσιν. Κατὰ τὰς ἀρχὰς Φεβρουαρίου 1959 ἡ γαλῆ παρουσίασεν ἐκ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων βλεννοματηρὸν ἔκκριμα. Εἰς τὰς 18 Φεβρουαρίου τέλος προσεκομίσθη καὶ ἐξητάσθη διὰ πρῶτην φορὰν ὑφ' ἡμῶν. Ἡ γενικὴ κατάστασις τοῦ ζώου ἦτο μετρίως καλή. Ἡ διὰ τῆς ψηλαφήσεως ἐξέτασις τῆς κοιλίας ἀπέβη ἀρνητικὴ ὡς πρὸς τὴν πιθανότητα κύσεως, ὡς ἐκ τούτου δὲ καὶ λόγῳ τοῦ ἐλαφροῦ ἐκκρίματος ἐκ τῶν γεννητικῶν ὀργάνων ἀπεφασίσθη ἡ στείρωσις δι' ὑστερεκτομῆς, τὴν ἐπομένην. Κατὰ τὴν διάνοξιν τῆς κοιλίας διεπιστώθη ἡ ὑπαρξὶς σημαντικοῦ ἀριθμοῦ σκωλήκων μεγέθους 3 - 4 ἐκ. ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλοι μὲν ἦσαν ἐλεύθεροι εἰς τὴν περιτοναϊκὴν κοιλότητα, ἄλλοι δὲ προσκεκολλημένοι εἰς τὸ μεσεντέριον καὶ τὸ ἥπαρ.

Ἀπεσπάσθησαν 20 περίπου σκωλήκους ἵνα χαρακτηρισθῶσι παρασιτολογικῶς, μετὰ ταῦτα δὲ ἐγένετο ἡ συρραφὴ τοῦ τραύματος ἐγκαταλειφθεῖσης τῆς ὑστερεκτομῆς, προκειμένου ὅπως ἀποφασίσῃ ὁ ιδιοκτῆτης τοῦ ζώου περὶ τῆς τύχης τοῦ μετὰ τὴν ἀνεύρεσιν τῶν ὡς ἄνω σκωλήκων. Μετὰ διήμερον ἀπεφασίσθη ἡ θυσία τοῦ ζώου. Κατὰ τὴν νεκροτομήν δὲν ἀνευρέθησαν ἀλλαχοῦ παράσιτα πλὴν τῆς ὡς ἄνω ἐντοπίσεως.

Οἱ σκωλήκες ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς ἀνήκοντες εἰς τὴν προνυμφικὴν μορφήν τοῦ *M. lineatus* : T. bailleti. Ὁ χαρακτηρισμὸς τούτων ἐπεβεβαιώθη ἀπὸ τὸν καθηγητὴν Α. Πανέτσον τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσα-

λονίκης, ὡς καὶ ἀπὸ τὸν καθηγητὴν T. Guillon τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Alfort.

2ον) Τὸ δεύτερον περιστατικὸν ἀφορᾷ τὸν ὥριμον σκόληκα ὅστις παρετηρήθη ἐπὶ κυνὸς γενεᾶς Fox terrier, ἄρρενος, 7 ἐτῶν, ιδιοκτησίας Γ.Ο.

Τὸ ἱστορικὸν ἀναφέρει κλινικὰς ἐκδηλώσεις ταινιάσεως ἀπὸ τριετίας καὶ πλέον. Κύων νευρωτικός, ὑπερευαίσθητος, παρουσιάζων ἐπ' ἐσχάτων καὶ ἐκ διαλειμμάτων νευρικὰς κρίσεις συνισταμένας εἰς σπασμούς καὶ εἰς καταληπτικὰς ἐκδηλώσεις.

Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι, εἰς τὰ κόπρανα ἀνευρίσκονται σταθερῶς σωματίδια χρώματος λευκωποῦ καὶ ὠοειδῆ, μεγέθους σησαμίου, τῶν ὁποίων ἡ φύσις δὲν εἶχεν καθορισθῇ κατὰ τὸ παρελθὸν καθ' ὅσον αἱ ἀλλεπάλληλοι ἐξετάσεις κοπράνων δι' ἐντερικὰ παράσιτα ἀπέβησαν ἀρνητικά. Αἱ θεραπευτικαὶ ἐπεμβάσεις διὰ διαφόρων ἀντιταινιακῶν σκευασμάτων (Tebopan «Wellcome», arecoline) προκαλοῦν προσωρινὴν αὔξησιν τῆς ἀποβολῆς τῶν ὡς ἄνω σωματιδίων, οὐχὶ ὅμως καὶ ἀποβολὴν ὀλοκλήρου τινὸς παρασίτου.

Τὴν 25 Μαρτίου 1961 ἀπεστάλλησαν ὑπὸ τοῦ θεράποντος Κτηνιάτρου (*) κόπρανα μὲ τὴν παράκλησιν ὅπως ἐρευνῇ καὶ καθορισθῇ ἡ φύσις τῶν ὡς ἄνω σωματιδίων. Ἡ μικροσκοπήσις ἀπέδειξεν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ προγλωττίδων τοῦ κεστώδους σκόληκος *M. lineatus*. Ἐφ' ἐκάστης προγλωττίδος διεκρίνεται εὐκρινῶς ἡ ὠοθήκη, πλήρης ὠρίμων καὶ χαρακτηριστικῶν τοῦ εἶδους ὠῶν, ἡ μήτρα, ὁ ἐκφορητικὸς πόρος εὐρισκόμενος εἰς τὸ μέσον τῆς προγλωττίδος ὡς καὶ οἱ ὄρχεις. Ἡ σύνθλιψις τῆς προγλωττίδος μεταξὺ ἀντικειμενοφόρου πλακὸς καὶ καλυπτρίδος προεκάλει τὴν ἀποβολὴν ἐκ τοῦ ὠοθύλακος μεγάλου ἀριθμοῦ ὠῶν ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐκρινῶς διεκρίνοντο διὰ μεγαλυτέρας μεγενθύσεως τὰ ζῶντα ἔμβρυα.

Μέχρι τῆς ἐπιδόσεως τῆς παρούσης μελέτης πρὸς δημοσίευσιν, οὐδὲν ἐπετεύχθη θεραπευτικῶς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1) Railliet, A., (1895): *Traité de zoologie med. et agricole*, Paris.
- 2) Neveu - Lemaire, M. (1936): *Traité d'Helminthologie Medicale et Veterinaire*, Paris.
- 3) Chandler, A. (1952): *Introduction to Parasitology*, New York.
- 4) Mönning, H.O., (1949): *Veterinary Helminthology and Entomology*, Baltimore.

(*) Τὸ ἀνωτέρω περιστατικὸν ἀπεστάλη πρὸς ἐρευναν ὑπὸ τοῦ συναδέλφου κ. Θ. Φελούκη.

R E S U M É**M. LINEATUS ET T. BAILLETI CHEZ DEUX CARNIVORES DOMESTIQUES**

P a r

A. G. VELTSOS, E. CRIMBITHIS, G. CLARCK

M. lineatus et T. bailleti ont été rencontrés pour la première fois en Grèce. Le premier a été trouvé dans l'intestin d'un chien et le second dans la cavité péritoneale d'un chat, certains étaient libres autres attachés au mésentère et au foie.

**ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΟΣΜΩΝ (*)**

Υ π ό

Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ καὶ C. BILLY

Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς ἐρεῦνης τῶν ὑπὸ τῶν ἀναεροβίων ἀπελευθερουμένων ἀερίων, καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς πραγματοποιηθείσης ἤδη ἐρεῦνης ἐπὶ τῶν κλωστηριδίων : *Inflabilis lacustris* (Prévot et Sarraf) καὶ *Clostridium corallinum* (Billy et Prévot) ἡσυχολήθημεν καὶ ἡμεῖς μὲ τὴν περίπτωσιν τοῦ *clostridium histolyticum*.

Τυχάνει γενικῶς παραδεδεγμένον ὅτι τὸ *Cl. histolyticum* (Weinberg καὶ Seguin) εἶναι ὑπεύθυνον οἰδήματος καὶ προκαλεῖ ἀποκόλλησιν καὶ λύσιν τῶν ἰστών.

Ἐπὶ τοῦ ἰνδοχοίρου ἡ γάγγραινα ἀπολήγει εἰς θάνατον ἐντὸς μιᾶς ἢ δύο ἡμερῶν, συνεπείᾳ μολύσεως.

Συγκρίνοντες καλλιέργειας τοῦ ἐν λόγῳ μικροβίου μετ' ἄλλων κλωστηριδίων, γενικῶς δυσόσμων, παρατηροῦμεν ὅτι ἐκεῖναι τοῦ *histolyticum* ἦσαν πολὺ ὀλιγώτερον δύσοσμοι τῶν ἄλλων κλωστηριδίων.

Ἦθελήσαμεν νὰ ἐρευνήσωμεν ἐὰν ἡ ιδιότης αὕτῃ τοῦ *Cl. histolyticum*

*) Ἐργασία λαβοῦσα χώραν εἰς τὸ Institut Pasteur τῶν Παρισίων, τμῆμα ἀναεροβίων, καὶ δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ «Annales de l'Institut Pasteur» Tome 101, p.p. 136 - 138.