ePublishing

EKT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

No 1 (1963)



ΔΕΛΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE

BULLETIN OF THE HELLENIC VET. MEDICAL SOCIETY

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ · ΜΑΡΤΙΟΣ 1963 ΤΕΥΧΟΣ 49ον

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1956

Ν. Κοεμτζόπουλος (Πρόεδρος) - Σ. Παπασπύρου ('Αντιπρόεδρος)
Κ. Ταρλατζής (Γεν. Γραμματεύς) - Χ. Δουμένης (Ειδ. Γραμματεύς)
Σ. 'Αϋφαντής (Ταμίας)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
Ν. Τζωρτζάκις, Κ. Ταρλατζής, Κ. Β. Σωτηρόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βοτανικός Κήπος - 'Αθήναι (Τ3)

SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE
Jardin Botanique - Athènes (T3)

HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY
Botanical Gardens - Athens (T3)

Article reviews

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: 10.12681/jhvms.18322

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1963). Article reviews. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, (1), 46–47. https://doi.org/10.12681/jhvms.18322

https://epublishing.ekt.gr | **e-Publisher:** EKT | **Downloaded at:** 06/08/2025 00:17:43

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. **Ananiades, B. & Debonera, G.**: Rapport général sur les maladies dûes aux anaerobies chez les animaux domestiques. Athènes 1936.
2. **Debonera, G. & Ananiades, B.**: Les gastro - entero - toxémies infectieuses du mouton. Rév. Gén. de Méd. Vét. 15 Juillet 1935.
3. **Δεμπονέρα, Γερ.**: Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐξ ἐναεροβίων τοξιλοιμώξεων τοῦ προβάτου Ἀθῆναι 1935.
4. **Butozan, V. & Mihajlovich, S.**: La propagation de l' enterotóxemie infectieuse des ovins en Yougoslavie. O.I.E. No 529.
5. **Δερμιτζάκη, Ἐμμαν.**: Ἡ ἐντεροτοξιναιμία, καὶ αἱ ἐξ αὐτῆς προξενηθεῖσαι ζημίαι τῶν προβάτων εἰς τὸν νομὸν Θεσ)νίκης 1958 - 1959. Ἑλλ. Κτηνιατρικὴ Τ. 5, 1959.
6. **Thoma, M. G.**: L' enterotoxemie infectieuse des ovins. Paris 1937. Thèse
7. **Katitch, R. V.**: Conceptions modernes sur la pathogenèse des enterotoxemies du mouton. O.I.E. XXIXe Session 1961.
8. **Kovalenko, J. R.**: Maladies des animaux provoquées par Welchia perfringens et Cl. oedematiens. O.I.E. XXIVIIIe Sessin 1960.
9. **Μαγκαφᾶ, Ἐλ·**: Προφορικὴ ἀνακοίνωσις.
10. **Quesada, A.**: La gastroenterotoxinemia degli ovini.La Clinica Veterinaria 1953.
11. **Rafyi, A.**: Les maladies causées par Cl. perfringens et Cl. Novyi O.I.E.
12. **Rafyi, A. & Ardahali, M.**: Les maladies des animaux dûes aux Cl. Welchii. O.I.E. Conference FAO/OIE.
13. **Prevot, A. R.**: Biologie des Maladies dûes aux anaerobies.
14. **Prevot, A. R.**: Techniques pour le diagnostic des bactéries anaérobies.
15. **Prevot, A. R.**: Manuel de classification et de determination des bacteries anaérobies 1957.
16. **Stevens, A. T.**: Enterotoxemia. The Vet. Record, October 3, 1959.
17. **Στυλιανοπούλου Μ.**: Οἱ ἀρρώστειες τῶν μηρυκαστικῶν μας. Ἀθῆναι, 1958.
18. **Φραγκοπούλου, Αδ.**: Ταυτοποίησις τῶν τύπων B. C. D. τοῦ γένους Welchia διὰ τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς ἀντιγονικῆς συνθέσεως. Δελτ. Ἑλλ. Κτην. Ἑταιρείας Τ. 46, 1962.
19. **Whitlock, J. H. & Fabricant, J.**: The use of Cl. Welchii type D anaculture in the prevention of overeating disease in sheep. The Cornell Veterinarian No 3, 1947.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) POLIN, D. WYNOSKY E. R., PORTER, C. C.: **Ἀμπρόλ. 9. Μελέται ἐπὶ τῆς ἀπορροφήσεως τοῦ ἀμπρόλ. ὡς καὶ τοῦ μετὰ τῆς θειαμίνης ἀνταγωνισμοῦ τούτου εἰς τοὺς νεοσσοὺς ὀρνίθων.** Amprolium. 9. studies on the Absorption of Amprolium and its Competition with Thiamine for Absorption in the chick). Poultry Science, V. XLI, No 5, 1962.

Περιεχόμενα ἐντερικοῦ σωλῆνος, προερχόμενα ἐκ νεοσσῶν ὀρνίθων θυσιασθέντων κατὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ διετρέφοντο μὲ φύραμα, περιέχον 0,0125 °/₀ ἀμπρόλ σημειωθὲν μὲ ραδιενεργὸν C_{14}, ἀπέδειξαν μίαν προοδευτικὴν αὔξησιν τῆς εἰς C_{14} πυκνότητος ἀπὸ τοῦ μυώδους στομάχου (7,4 γ)γραμ.) μέχρι τοῦ σημείου συναντήσεως τῶν τυφλῶν εἰς τὸ κατώτερον τμῆμα τοῦ λεπτοῦ ἐντέρου (35γ/γραμ.). Τὸ περιεχόμενον τῶν τυφλῶν ἐντέρων εὑρέθη ἔχον ὑψηλὸν ποσοστὸν πυκνότητος εἰς C_{14}, ἀντιπροσωπεῦον ἴσην ἀξίαν πρὸς 144 γ/γραμ. ἀμπρόλ. Τὰ ἀποτελέσματα ταῦτα ὑποδηλοῦν ὅτι τὸ κοκκιδιοστατικὸν τοῦτο ἀπορροφᾶται εἰς τὸ ἀνώτερον τμῆμα τοῦ ἐντερικοῦ σωλῆνος.

Ἕτεραι ἔρευναι ἐπὶ τῆς ἀπορροφήσεως τοῦ ἀμπρόλ, διὰ τῆς τεχνικῆς τῆς In Situ περιδέσεως διαφόρων τμημάτων τοῦ γαστρο - ἐντερικοῦ σωλῆνος, ἔδειξαν ὅτι τὸ δωδεκαδάκτυλον ἔχει τὴν μεγαλυτέραν ἱκανότητα ἀπορροφήσεως τοῦ ἀμπρόλ. Ἐπὶ προσθέτως, εὑρέθη ὅτι ἡ θειαμίνη, προστιθεμένη εἰς τὸ ἀμπρόλ, μειώνει τὴν ἀπορρόφησιν τούτου ἐντὸς τοῦ δωδεκαδακτυλικοῦ βρόχου. Τὸ τελευταῖον τοῦτο εὕρημα ἀποδεικνύει ἀμέσως ὅτι τὸ ἀμπρόλ καὶ ἡ θειαμίνη συναγωνίζονται ὡς πρὸς τὴν διαβατότητα τοῦ ἐντερικοῦ τοιχώματος. Π.Ν.Δ.

2) HEBDEN S. P. : **Ἡ ἀνθελμινθικὴ ἐνέργεια τῆς Θιαμπενταζόλης.** The Anthelmintic Activity of Thiabendazole MK360. (The Australian Vet. Journal, July 1961).

Ὁ ἐρευνητὴς περιγράφει τὰς λεπτομερείας τριῶν πειραμάτων γενομένων εἰς τὴν ὕπαιθρον καὶ δύο ἑτέρων ἐργαστηριακῶν, δίδων τὰ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα, ἑνὸς νέου ἀνθελμινθικοῦ φαρμάκου συγκριτικῶς ὡς πρὸς τὴν φαινοθειαζίνην, τοῦ MK360 ἢ Θιαμπενταζόλης.

Τὰ πειράματα ταῦτα ἂν καὶ ἐγένοντο μόνον ἐπὶ προβάτων καὶ ἔναντι ὡρισμένων εἰδῶν σκωλήκων, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ θιαμπενταζόλη εἶναι ἕνα ὑψηλῆς ἀποτελεσματικότητος ἀνθελμινθικὸν καὶ σχετικῶς μὴ τοξικόν, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀβλαβὲς διὰ τὸ ζῶον εἰς τὸ 20/πλάσιον τῆς θεραπευτικῆς δόσεως. Εἶναι σπάνιον δι' ἕνα ἰδιοσκεύασμα νὰ ἔχῃ τοιαύτην ἐνέργειαν ἐναντίον τῶν νηματωδῶν σκωλήκων εἰς διάφορα μέρη τοῦ πεπτικοῦ σωλῆνος.

Τὰ ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα, τὰ ἀναφερόμενα ὑπὸ τοῦ συγγραφέως, ἐπετεύχθησαν ἄνευ οἱασδήποτε προηγουμένης νηστείας ἢ ἑτέρας προετοιμασίας τῶν οὕτω θεραπευθέντων ζώων.

Τὸ προϊὸν τοῦτο, τὸ ὁποῖον προσφάτως παρεσκευάσθη συνθετικῶς ἀπεδείχθη ἀνώτερον τῆς φαινοθειαζίνης ἐναντίον πλείστων ἐκ τῶν κυρίων γαστροεντερικῶν στρογγύλων σκωλήκων.

Τέλος, ὁ συγγραφεύς, συνιστᾷ περαιτέρω ἐκτεταμένους πειραματισμούς. Π.Ν.Δ.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Παρὰ τῆς Δ/νσεως Κτηνιατρικοῦ Γ.Ε.Σ. ἐξεδόθη πρό τινος, Κανονισμός, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἔλεγχος Τροφίμων Ζωϊκῆς Προελεύσεως».

Ὁ Κανονισμὸς οὗτος ἐξ 110 σελίδων ἐξεπονήθη ὑπὸ Στρατιωτικῶν Κτηνιάτρων, πρὸς ἀντικατάστασιν ἄλλου παλαιοτέρου, ἐπὶ τῆς προκατόχου Δ/νσεως, τῇ προτροπῇ τοῦ τότε Δ/ντοῦ Ταξιάρχου Ἐμμ. Ματθαιάκη, ὁ ὁποῖος μάλιστα προέβη εἰς σημαντικὰς τροποποιήσεις καὶ βελτιώσεις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου. Ἡ ἐκτύπωσις τοῦ Κανονισμοῦ ἐγένετο εἰς τὸ Στρατιωτικὸν Τυπογραφεῖον, ἐβράδυνε ὅμως διὰ τεχνικοὺς λόγους.

Ὁ Κανονισμὸς περιλαμβάνει 15 εἰκόνας φιλοτεχνηθείσας παρὰ τῆς Γεωγραφικῆς Ὑπηρεσίας Στρατοῦ, ἀναλυτικὸν ἀλφαβητικὸν εὑρετήριον περιεχομένων καὶ ὑποδιαιρεῖται εἰς 7 μέρη:

Τὸ 1ον μέρος, ἀφορᾷ τὴν εἰσαγωγήν.

Εἰς τὸ 2ον μέρος, ὑποδιαιρούμενον εἰς 3 Κεφάλαια περιγράφονται