

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 23, No 3 (1972)

Υπεύθυνος σφραγίδας τῆς γῆρας :

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ἐπιστημονικὸν Σωματεῖον ἀνεγνώρι-
σθένον, ἀριθ. ἀποφ. 5410/19.2.1923
Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.
Πρόεδρος διὰ τὸ ἔτος 1972:
Ἰωάννης Καρφόσις,
Κηφισίας 56, Ἀθήναι.

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ἐκδίδεται ὑπὸ ἀμετρῆς πεν-
ταμελοῦς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς (Σ.Ε.)
μελῶν τῆς Ε. Κ. Ε.

Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Ὁ Πρόεδρος
τῆς Σ.Ε. Παναγιῆς Ν. Αργάνης
Ὁδ. Βυζαντίου 5— Νέα Σμύρνη
Μέλη Συν/κῆς Ἐκ.: Ε. Ν. Στοφόρος
Κ. Χ. Σιατάρδης
Μ. Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου
Δ. Χ. Μερβίος

ΠΡΟ-ἸΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αἰλή Κοβάνη
Θεσσαλονίκης 65 - Μοσχάτον

ΓΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Ἀθήναι
ἡΜΕΡ. ΤΥΠΩΣΕΩΣ: Ὀκτώβριος 1972


Γραφ. Διεύθυνσις:
Ταχ. θυρίς 546
Κεντρικὸν Ταχυδρομεῖον
Ἀθῆναι

Ἐνδραμοί:
Ἐτησίαν ἑξαετηρικῶν δραχ. 200
Ἐτησίαν ἑξαετηρικῶν δραχ. 300
Ἐτησίαν φοιτητῶν ἡμεδαπῆς δραχ. 50
Ἐτησίαν φοιτητῶν ἀλλοδαπῆς δραχ. 100
ἡμὴ ἐκάστου τεύχους δραχ. 50

Address: P.O.B. 546
Central Post Office
Athens - Greece

Redaction: Dr. P. N. Dragonas
Vyzantiou str. 5
Nea Smyrni, Athens.
Greece.

Subscription rates:
(Foreign Countries)
\$ U. S. A. 10 per year.



Δελτίον
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
ΤΟΜΟΣ 23 Ἰούλιος - Σεπτέμβριος
ΤΕΥΧΟΣ 3 1972

Bulletin
OF THE HELLENIC
VETERINARY MEDICAL SOCIETY

QUARTERLY
SECOND PERIOD
VOLUME 23 July - September
No 3 1972

Article reviews

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.20076](https://doi.org/10.12681/jhvms.20076)

Copyright © 2019, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1972). Article reviews. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 23(3), 200–201.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.20076>

Ἀναλύσεις ἐργασιῶν

Abstracts

Θεραπεία τῆς κυστικῆς ἐκφυλίσεως τῶν ὠοθηκῶν τῶν ἀγελάδων

Ὑπὸ

Κ. ΣΕΓΓΙΑΡΙΔΗ

Συγγραφεὺς	Ἀριθμὸς ἀγελάδων	Θεραπευτικὴ ἀγωγή	Ἀποτελέσματα	
			Ἰασις	Ἐγκυμ.
Fiebigler (1969)	25 α)	Ἐνδοκυστικῶς : Choriongonadotropin (1.000 U.I.). Εἰς 4 ἀγελάδας ἡ ἐνδοκυστικὴ ἐγχύσις ἐπανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν. Ἐκ τῶν 25 ἀγελάδων αἱ 24 ἐπαρουσίαζον ἐνδομητρίτιδα II ἢ III. Εἰς τὰς ἀγελάδας αὐτὰς ἐνηργήθησαν 1—2 ἐνδομήτριάι ἐγχύσεις τετραμυκίνης καὶ βιταμίνης A.	88.0 %	80.0 %
	25 β)	Ἐνδοφλεβίως : Choriongonadotropin. (5.000 U.I.) καὶ συγχρόνως ρῆξις τῶν κύστεων, μέσῳ ἀπηυθυσμένου, διὰ τῆς χειρὸς. Εἰς 5 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν. Αἱ 20 ἀγελάδες ἐπαρουσίαζον καὶ ἐνδομητρίτιδα II ἢ III. Εἰς τὰς ἀγελάδας αὐτὰς ἐνηργήθησαν 1—2 ἐνδομήτριάι ἐγχύσεις Lugol (100—200 κ. ἐκ.).	72.0 %	72.0 %
	25 γ)	Ἐνδοπεριτονικῶς : Choriongonadotropin (5.000 U.I.) καὶ συγχρόνως ρῆξις τῶν κύστεων, μέσῳ ἀπηυθυσμένου, διὰ τῆς χειρὸς. Εἰς 4 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν καὶ εἰς 1 ἀγελάδα διὰ τρίτην φοράν. Αἱ 13 ἀγελάδες ἐπαρουσίαζον καὶ ἐνδομητρίτιδα II ἢ III. Εἰς τὰς ἀγελάδας αὐτὰς ἐνηργήθησαν 1—2 ἐνδομήτριάι ἐγχύσεις Lugol (100—200 κ. ἐκ.).	88.0 %	88.0 %
	25 δ)	Ἐνδομυϊκῶς : Acetoxyprogesteron (50mg) καὶ συγχρόνως ρῆξις τῶν κύστεων, μέσῳ ἀπηυθυσμένου, διὰ τῆς χειρὸς. Εἰς 12 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπανελήφθη διὰ δευτέραν καὶ εἰς 2 ἀγελάδας διὰ τρίτην φοράν. Αἱ 19 ἀγελάδες ἐπαρουσίαζον καὶ ἐνδομητρίτιδα II ἢ III. Εἰς τὰς ἀγελάδας αὐτὰς ἐνηργήθησαν 1—2 ἐνδομήτριάι ἐγχύσεις Lugol (100—200 κ. ἐκ.).	76.0 %	68.0 %

Heidrich und Fiebiger (1970)	25 α) Ἐνδοκυστικῶς : Choriongonadotropin. (1.000 U.I.). Εἰς 4 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπιανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν.	— 80.0 %
	25 β) Ἐνδοπεριτοναϊκῶς : Choriongonadotropin (5.000 U.I.) καὶ συγχρόνως ρῆξις τῶν κύστεων, μέσφ ἀπηυθυσμένου, διὰ τῆς χειρός. Εἰς 3 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπιανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν. — Εἰς τὰς ἀγελάδας, αἵτινες ἐπαρουσίαζον συγχρόνως καὶ ἐνδομητρίτιδα, ἐνηργήθησαν 1—2 ἐνδομήτριάι ἐγκύσεις τετραμυκίνης καὶ βιταμίνης A ἢ Lugol (100—200 κ.ἐκ.).	— 88.0 %
Strobel (1970) καὶ Heidrich und Strobel (1971)	32 Ἐνδοπεριτοναϊκῶς (εἰς δεξιὸν κενεῶνα) Choriongonadotropin (3.000 U.I.). Εἰς 11 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπιανελήφθη διὰ δευτέραν φοράν.	100.0 % 90.6 %
Weinzierl (1971) καὶ Heidrich und Weinzierl (1972)	100 Ἐνδοπεριτοναϊκῶς : Choriongonadotropin (3.000 U.I.) + Progesteron (125 mg) καὶ συγχρόνως ρῆξις τῶν κύστεων, μέσφ ἀπηυθυσμένου, διὰ τῆς χειρός. Εἰς 11 ἀγελάδας ἡ θεραπεία ἐπιανελήφθη διὰ δευτέραν καὶ εἰς 1 ἀγελάδα διὰ τρίτην φοράν. Αἱ 88 ἀγελάδες ἐπαρουσίαζον συγχρόνως καὶ ἐνδομητρίτιδα. Εἰς τὰς ἀγελάδας αὐτὰς ἐνηργήθη ἐνδομήτριος ἐγκυσις 2 % Lotagen (100—200 κ. ἐκ.). — Ἐκ τῶν 100 ἀγελάδων αἱ 75 ἐπαρουσίαζον μεγαλοκυστικὴν καὶ αἱ 25 μικροκυστικὴν ἐκφύλισιν τῶν ὠοθηκῶν.	92.0 % (76.0%)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. FIEBIGER K. (1969) : Diss. Berlin.
2. HEIDRICH H., und FIEBIGER K. (1970) : Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. **83**, 204—205.
3. HEIDRICH H., und STROBEL K. (1971) : Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. **84**, 174—176.
4. HEIDRICH H. und WEINZIERL K. (1971) : Tierärztl. Umsch. **27**, 108—111.
5. STROBEL K. (1970) : Diss. Berlin.
6. WEINZIERL K. (1971) : Diss. Berlin.